



Clube do
Produtor

BRF
BRASIL FOODS



Elegê



Sadia

de Leite

CATÁLOGO

de Produtos

O Clube do Produtor de Leite BRF,

que colabora com o desenvolvimento das propriedades leiteiras do Brasil, selecionou uma completa linha de produtos para atender às necessidades diárias da sua propriedade.

Com experiência em negociações de grandes volumes, a BRF consegue vender produtos de diversas marcas a preços competitivos, que podem ser descontados na Conta Leite e entregues na sua propriedade.

Para facilitar a visualização dos produtos e a realização dos seus pedidos, a BRF desenvolveu este catálogo.

Confira a seguir a lista de produtos disponíveis para parceiros do Clube do Produtor de Leite.



Saúde Animal

Medicamentos



Medicamentos

Pensando na saúde dos animais, o Clube do Produtor apresenta diversas opções de medicamentos, fabricados por laboratórios reconhecidos no Brasil. Não perca mais essa oportunidade que a BRF oferece para você, parceiro.

Antibióticos Intramamários para vacas em lactação



BOVIGAM L

Apresentação:

• 5 g | cód. 128578



COBACTAN VL

Apresentação:

• 8 g | cód. 885594



MASTIFIN

Apresentação:

• 10 ml | cód. 997829



MASTIJET FORTE

Apresentação:

• 8 g | cód. 885593



NEWMAST

Apresentação:

• 100 ml | cód. 885872



SPECTRAMAST

Apresentação:

• 10 ml | cód. 970098



SUPRONAL L

Apresentação:

• 8 g | cód. 128639



VETIMAST PLUS VL

Apresentação:

• 10 g | cód. 130314

Antibióticos Intramamários para vacas secas



BOVIGAM VS

Apresentação:

• 4,5 g | cód. 128615



CEPRAVIN

Apresentação:

- 3 g | cód. 877834



EMEMAST VS

Apresentação:

- 5 g | cód. 885592



MASTIFIN VS

Apresentação:

- 10 g | cód. 877832



ORBENIN

Apresentação:

- 3,6 g | cód. 970096

VETIMAST PLUS VS

Apresentação:

- 10 g | cód. 130361



Antibióticos Injetáveis



AFILOSINA

Apresentação:

- 50 ml | cód. 802632



AGROVET PLUS

Apresentação:

- 50 ml | cód. 961530



BORGAL

Apresentação:

- 50 ml | cód. 110345



CEFTIOMAX

Apresentação:

- 100 ml | cód. 824582



COBACTAN

Apresentação:

- 50 ml | cód. 946502



CORTA CURSO

Apresentação:

- 50 ml | cód. 26777



ESTREPTOMAX

Apresentação:

- 6,25 g | cód. 26802



GANASEG PLUS

Apresentação:

- 50 ml | cód. 130362



GENTAMOX

Apresentação:

- 100 ml | cód. 966521



IMICARB

Apresentação:

- 15 ml | cód. 876737



IMIZOL

Apresentação:

- 15 ml | cód. 159490



KINETOMAX

Apresentação:

- 50 ml | cód. 812911
- 100 ml | cód. 978945



MINOXEL PLUS

Apresentação:

- 100 ml | cód. 942207



OUROTETRA PLUS LA

Apresentação:

- 50 ml | cód. 26799



PARTOCILINA

Apresentação:

- 7,53 g | cód. 230510



PENFORT PPU

Apresentação:

- 50 ml | cód. 22633



PIROFORT

Apresentação:

- 30 ml | cód. 876735



QUINOTRIL

Apresentação:

- 50 ml | cód. 824301



QUINOTRIL PLUS

Apresentação:

- 50 ml | cód. 863865



SUPERTRIN

Apresentação:

- 15 ml | cód. 876731



TALCIN MAX

Apresentação:

- 50 ml | cód. 131248



TERRAMICINA/LA

Apresentação:

- 20 ml | cód. 844480
- 50 ml | cód. 110906



TOPCEF

Apresentação:

- 20 ml | cód. 122136
- 80 ml | cód. 993719



TORMICINA LA

Apresentação:

- 20 ml | cód. 966538
- 50 ml | cód. 135690



TRISSULFIN INJETÁVEL

Apresentação:

- 50 ml | cód. 876730

Analgésicos e Anti-inflamatórios

D-500

Apresentação:

- 50 ml | cód. 979610



DESFLAN

Apresentação:

- 50 ml | cód. 662496



DICLOFENACO

Apresentação:

- 50 ml | cód. 328227



ISACORT

Apresentação:

- 10 ml | cód. 110337



NAQUASONE INJETÁVEL

Apresentação:

- 10 ml | cód. 970100



NIGLUMINE

Apresentação:

- 50 ml | cód. 802084



VETFLOGIN

Apresentação:

- 50 ml | cód. 159491

Antitóxicos

HEPATOXAN

Apresentação:

- 100 ml | cód. 124567



MERCEPTON

Apresentação:

- 100 ml | cód. 110523

Antiparasitários



ACATAK POUR ON

Apresentação:


• 5 litros | cód. 270490



ASPERSIN

Apresentação:

• 34 ml | cód. 24330



CICLORFÓS

Apresentação:

• 1 litro | cód. 132909



COLOSSO PULVERIZAÇÃO

Apresentação:

- 1 litro | cód. 875724



GENESIS IVER POUR-ON

Apresentação:

- 1 litro | cód. 993697



IVOMEC GOLD

Apresentação:

- 50 ml | cód. 149414
- 1 litro | cód. 32000



VINGADOR MATA BICHEIRA

Apresentação:

- 475 ml | cód. 979653



RIPERCOL L-150F

Apresentação:

- 250 ml | cód. 979596



TACPLUS

Apresentação:

- 1 litro | cód. 876727



TOPLINE POUR-ON

Apresentação:

- 1 litro | cód. 966516



VALBAZEN

Apresentação:

- 1 litro | cód. 590274

Soros e Vitaminas



CALCIFÓS

Apresentação:

- 500 ml | cód. 801824



CÁLCIO REFORÇADO

Apresentação:

- 200 ml | cód. 876741



FERRODEX

Apresentação:

- 50 ml | cód. 979608



FORTEMIL

Apresentação:

- 500 ml | cód. 876732



FOSBIO + D₂

Apresentação:

- 100 ml | cód. 141179
- 500 ml | cód. 141178



GLUCAFÓS

Apresentação:

- 200 ml | cód. 802636



KERA DRENCH

Apresentação:

- 1 kg | cód. 140770

VALLÉE VITA ADE

Apresentação:

- 50 ml | cód. 119300



Vacina contra Mastite

TOPVAC

Apresentação:

- 1 dose | cód. 133404
- 5 doses | cód. 801716
- 25 doses | cód. 801715



Hormônios e Análogos



BOOSTIN

Apresentação:

- 2 ml | cód. 26318



OCITOVET

Apresentação:

- 50 ml | cód. 994121



POSTIPOFISIN

Apresentação:

- 20 ml | cód. 992156

PROFERTIL

Apresentação:

- 5 ml | cód. 993696



SINCROCIO

Apresentação:

- 4 ml | cód. 876739
- 20 ml | cód. 966539



SINCROFORTE

Apresentação:

- 20 ml | cód. 26801

Homeopatas



FATOR M&P PÓ

Apresentação:

- 400 g | cód. 886166



HOMEOPATIA REAL H

Apresentação:

- Convert H Leite - 20 kg | cód. 27470
- Mastite - 600 g | cód. 886140
- Mastite - 20 kg | cód. 27608
- Papilomatose - 600 g | cód. 886128
- Parasitário - 600 g | cód. 27630
- Parasitário - 20 kg | cód. 27626
- Pasta Entérica - 45 g | cód. 27593

Qualidade do Leite

Higiene e Limpeza



Detergentes Ácidos



A-500 PREMIUM

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966290
- 20 litros | cód. 966295
- 50 litros | cód. 25904



DELLA-ACID

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966063
- 20 litros | cód. 966065



HYPRACID

Apresentação:

- 12 kg | cód. 855231
- 24 kg | cód. 855247



MASTER ACID

Apresentação:

- 5 litros | cód. 965956
- 20 litros | cód. 965976



MASTER ACID PLUS

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966000
- 20 litros | cód. 966018

Detergentes Alcalinos Clorados

DELLA-ACTION

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966284
- 20 litros | cód. 966286





HYPROCLOR

Apresentação:

- 12 kg | cód. 855238
- 24 kg | cód. 855251



MASTER CLEAN

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966038
- 20 litros | cód. 966046



MASTER CLEAN PLUS

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966052
- 20 litros | cód. 966058



S-100 PREMIUM

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966299
- 20 litros | cód. 966306
- 50 litros | cód. 25905

Detergentes para Limpeza Manual

D-1000

Apresentação:

- 5 litros | cód. 25907
- 10 litros | cód. 25908
- 50 litros | cód. 25914



DELLA WASH

Apresentação:

- 5 litros | cód. 876745
- 20 litros | cód. 966543



MASTER CAMP

Apresentação:

- 5 litros | cód. 29264

Produtos para Pré-dipping



DELLA-PRO

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966343



DERMISAN

Apresentação:

- 10 kg | cód. 994136



HEXIDERM

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966315
- 20 litros | cód. 140870
- 50 litros | cód. 25916



PREFOAM

Apresentação:

- 10 kg | cód. 994115
- 20 kg | cód. 855261

Produtos para Pós-dipping



DERMAGEL

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966311
- 20 litros | cód. 149425
- 50 litros | cód. 158602



FILMADINE

Apresentação:

- 10 kg | cód. 994114
- 22 kg | cód. 855269
- 60 kg | cód. 149374



GOLDEN MIX

Apresentação:

- 20 kg | cód. 124075
- 45 kg | cód. 105132



HM VIR FILM PLUS

Apresentação:

- 10 kg | cód. 27836
- 22 kg | cód. 27837



MASTER GOLD

Apresentação:

- 5 litros | cód. 966062
- 20 litros | cód. 950751

U-20 2,5%

Apresentação:

- 5 litros | cód. 801431
- 10 litros | cód. 801434
- 50 litros | cód. 25906



U-20 5%

Apresentação:

- 5 litros | cód. 979647
- 20 litros | cód. 979649

Sanitizantes



AGRISEPT MC TABS

Apresentação:

- Pastilhas | cód. 997830



DELLA-SAN

Apresentação:

- 4,1 litros | cód. 975197



MASTER CLHOR

Apresentação:

- 5 litros | cód. 947212

TECSA CLOR

Apresentação:

- 1 kg | cód. 980515



Materiais para Ordenha



AQUECEDOR

Apresentação:

- cód. 918687



BALDES

Apresentação:

- Oval com cúpula
10 litros | cód. 23165
- Oval com cúpula
15 litros | cód. 23123
- Balde plástico
12 litros | cód. 23170
- Balde plástico graduado
10 litros | cód. 23133
- Balde PP
20 litros | cód. 872120



CANECA DE FUNDO PRETO

Apresentação:

- Cód. 26233

COPO APLICADOR

Apresentação:

- Copo aplicador pós-dipping Hypred | cód. 21795
- Copo aplicador pré-dipping Hypred | cód. 999785
- Copo aplicador sem retorno Baspan | cód. 26008
- Copo aplicador sem retorno Weizur | cód. 999782



ESCOVAS

Apresentação:

- Escova cilíndrica Weizur 18 mm | cód. 25043
- Escova manivela teteira Delaval | cód. 24282
- Escova manivela teteira Escovasul | cód. 995898
- Escova manivela teteira Weizur | cód. 24269
- Escova nylon 20 cm | cód. 868771
- Escova para balde e latão | cód. 22660
- Escova para bocal de tanque Delaval | cód. 24291
- Escova para bocal de tanque Escovasul | cód. 868725
- Escova para bocal de tanque Weizur | cód. 24800
- Escova para saída de tanque Plantel | cód. 23827
- Escova para tanque resfriador Escovasul | cód. 995894
- Escova tanque resfriador com cabo Weizur | cód. 24272
- Escova tanque resfriador sem cabo Delaval | cód. 24287
- Escova universal | cód. 22656
- Escova universal - refil | cód. 22658





SOLUÇÃO CMT

Apresentação:

- 500 ml | cód. 23511



RAQUETE CMT

Apresentação:

- Raquete CMT | cód. 27050
- Raquete CMT Fatec | cód. 97666



PAPEL TOALHA

Apresentação:

- 19,5 x 26,5 cm | cód. 23491
- 23 x 20 cm | cód. 800715

Alimentação Animal



Nutricionais

Nutricionais

A BRF é a maior fabricante nacional de rações. Por isso, o Clube do Produtor disponibiliza produtos com alta qualidade e preços diferenciados aos produtores. Além disso, tem parceria com empresas que fornecem alimentos formulados para garantir a produtividade do seu negócio.

Sal Mineral



TOP MILK P

Apresentação:

• 30 kg | cód. 150521



TOP MILK NÚCLEO

Apresentação:

• 25 kg | cód. 999913



TOP MILK VITAMINADO

Apresentação:

• 30 kg | cód. 999912



MINERSAL ALKAMIX

Apresentação:

• 20 kg | cód. 991287



MINERSAL EQUILÍBRIUM

Apresentação:

• 20 kg | cód. 991080



MINERSAL NÚCLEO

Apresentação:

• 20 kg | cód. 991072



MINERSAL PROBIO

Apresentação:

• 20 kg | cód. 991075



MINERSAL 60 ADE

Apresentação:

• 20 kg | cód. 991076



MINERSAL 90 ADE

Apresentação:

• 20 kg | cód. 991074



NOVO BOVIGOLD

Apresentação:

• 30 kg | cód. 996489



BOVIPASTO

Apresentação:

• 30 kg | cód. 996488

MINERSAL PRÉ-PARTO

Apresentação:

• 20 kg | cód. 991079

MINERSAL PRÓ-BIOTINA

Apresentação:

• 20 kg | cód. 803639

Sucedâneo Lácteo

TERNELEITE EXPRESS

Apresentação:

• 10 kg | cód. 991055





TERNELEITE PREMIUM AZUL

Apresentação:

- 10 kg | cód. 801363




TERNELEITE PREMIUM

Apresentação:

- 10 kg | cód. 991052

Modelador Ruminal



SUPL. MIN. PROT. VITAX-LAC

Apresentação:


- 10 kg | cód. 994157

Gordura Protegida

ÓLEO VEGETAL SECO 100%

Apresentação:

• 25 kg | cód. 151680



AGELAC 84

Apresentação:

• 25 kg | cód. 125056



Aditivo Sequestrante Micotoxina

TOXFREE MILKPOWER

Apresentação:

• 10 kg | cód. 801365




Ração Pré-inicial

TERNELEITE PRÉ-INITIAL

Apresentação:

• 15 kg | cód. 991071

Rações



REGIÃO 01 - RS

Apresentação:

- Concentrado Proteico Bovino Leite Saco 25 kg | cód. 444669
- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB 77,5 NDT Granel | cód. 885177
- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB 77,5 NDT Saco 40 kg | cód. 885178
 - Ração Bovino Lactação Farelada 20%PB Granel | cód. 919095
 - Ração Bovino Lactação Farelada 20%PB Saco 40 kg | cód. 919097
- Ração Bovino Lactação Farelada 22%PB 74 NDT Granel | cód. 879398
- Ração Bovino Lactação Farelada 22%PB AE Saco 40 kg | cód. 393282
- Ração Bovino Lactação Farelada 24%PB 74 NDT Granel | cód. 879952
- Ração Bovino Lactação Farelada 24%PB 74 NDT Saco 40 kg | cód. 879954
- Ração Bovino Lactação Peletizada 16%PB 74 NDT Saco 40 kg | cód. 809624
 - Ração Bovino Lactação Peletizada 16%PB 74 NDT Granel | cód. 856289
 - Ração Bovino Lactação Peletizada 18%PB 77,5 NDT Granel | cód. 885175
- Ração Bovino Lactação Peletizada 18%PB 77,5 NDT Saco 40 kg | cód. 885176
 - Ração Bovino Lactação Peletizada 20%PB Granel | cód. 919094
 - Ração Bovino Lactação Peletizada 20%PB Saco 40 kg | cód. 919096
 - Ração Bovino Lactação Peletizada 22%PB AE Granel | cód. 637734
- Ração Bovino Lactação Peletizada 22%PB AE Saco 40 kg | cód. 814247

REGIÃO 02 - SC

Apresentação:

- Ração Bovino Inicial Bezerro Peletizada Saco 25 kg | cód. 262099
- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB AE Granel | cód. 993823
- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB Granel | cód. 918991
- Ração Bovino Lactação Peletizada 16%PB 74 NDT Granel | cód. 856289
- Ração Bovino Lactação Peletizada 18%PB AE Granel | cód. 356387
- Ração Bovino Lactação Peletizada 18%PB Granel | cód. 918990
- Ração Bovino Lactação Peletizada 18%PB Saco 40 kg | cód. 918992
- Ração Bovino Lactação Peletizada 19%PB AE Granel | cód. 912652
- Ração Bovino Lactação Peletizada 19%PB AE Saco 40 kg | cód. 997209
- Ração Bovino Lactação Peletizada 19%PB Granel | cód. 827106
- Ração Bovino Lactação Peletizada 20%PB AE Granel | cód. 757594
- Ração Bovino Lactação Peletizada 20%PB Granel | cód. 919094
- Ração Bovino Lactação Peletizada 22%PB AE Granel | cód. 637734

REGIÃO 02 - PR

Apresentação:

- Ração Bovino Inicial Bezerro Peletizada Saco 40 kg | cód. 971249
- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB AE Granel | cód. 993823
- Ração Bovino Lactação Peletizada 18%PB AE Granel | cód. 956476
- Ração Bovino Lactação Peletizada 18%PB Saco 40 kg | cód. 918992
- Ração Bovino Lactação Peletizada 19%PB AE Granel | cód. 912652
- Ração Bovino Lactação Peletizada 22%PB AE Granel | cód. 637734
- Ração Bovino Lactação Peletizada 22%PB AE Saco 40 kg | cód. 814247

REGIÃO 03 - PE

Apresentação:

- Ração Bovino Inicial Bezerro Saco 40 kg | cód. 393258
- Ração Bovino Lactação Farelada 19%PB Saco 40 kg | cód. 814316
- Ração Bovino Lactação Farelada 24%PB 74 NDT Saco 40 kg | cód. 879954
- Ração Bovino Lactação Farelada 29%PB Saco 40 kg | cód. 859216

REGIÃO 03 - MG, RJ E SP

Apresentação:

- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB Granel | cód. 918991
- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB Saco 40 kg | cód. 919391
 - Ração Bovino Lactação Farelada 20%PB Granel | cód. 919095
- Ração Bovino Lactação Farelada 20%PB Saco 40 kg | cód. 919097
 - Ração Bovino Lactação Farelada 22%PB AE Granel | cód. 879398
- Ração Bovino Lactação Farelada 22%PB AE Saco 40 kg | cód. 393282
- Ração Bovino Lactação Farelada 24%PB 74 NDT Granel | cód. 879952
- Ração Bovino Lactação Farelada 24%PB 74 NDT Saco 40 kg | cód. 879954
 - Ração Bovino Lactação Farelada 27%PB Granel | cód. 102081
- Ração Bovino Lactação Farelada 27%PB Saco 40 kg | cód. 102082

REGIÃO 04 - GO

Apresentação:

- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB Granel | cód. 918991
- Ração Bovino Lactação Farelada 18%PB Saco 40 kg | cód. 919391
 - Ração Bovino Lactação Farelada 20%PB Granel | cód. 919095
- Ração Bovino Lactação Farelada 20%PB Saco 40 kg | cód. 919097
 - Ração Bovino Lactação Farelada 22%PB AE Granel | cód. 879398
- Ração Bovino Lactação Farelada 22%PB AE Saco 40 kg | cód. 393282
- Ração Bovino Lactação Farelada 24%PB 74 NDT Granel | cód. 879952
- Ração Bovino Lactação Farelada 24%PB 74 NDT Saco 40 kg | cód. 879954
 - Ração Bovino Lactação Farelada 27%PB Granel | cód. 102081
- Ração Bovino Lactação Farelada 27%PB Saco 40 kg | cód. 102082

INFORMAÇÕES

Técnicas

Antibióticos Intramamários para vacas em lactação

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVIGAM L	Ampicilina + Cloxacilina	Mastites	1 seringa no quarto infectado com intervalo de 12h, durante 3 ordenhas consecutivas	Intramamária	72h após a última aplicação
COBACTAN VL	Sulfato de cefquinoma	Controle das mastites clínicas de vacas lactantes	1 seringa no quarto infectado após cada ordenha (2 a 3 infusões)	Intramamária	60h após o último tratamento ou após 5 ordenhas
MASTIFIN	Gentamicina + Cloridrato de bromexina	Tratamento das mastites agudas ou crônicas dos bovinos, causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos sensíveis à gentamicina	1 seringa em cada quarto afetado, com intervalo de 24h, podendo ser repetido por até 3 dias	Intramamária	96h da última aplicação do produto
MASTIJET FORTE	Tetraciclina + Neomicina + Bacitracina + Prednisolona	Tratamento para mastites subclínicas e clínicas (agudas e crônicas) em vacas em lactação	1 seringa no quarto afetado. O tratamento pode ser repetido em intervalos de 24h, por pelo menos 3 dias	Intramamária	Descarte o leite durante o tratamento e por 3 dias após o último tratamento
NEWMAST	Flumetasona + Neomicina + Espiramicina	Tratamento da mastite aguda ou crônica em vacas em lactação	1 seringa no quarto afetado, repetir a aplicação após 12, 24 e/ou 48h	Intramamária	6 dias após a última aplicação do produto
SPECTRAMAST	Cloridrato de ceftiofur	Tratamento clínico da mastite em vacas leiteiras lactantes	1 seringa no quarto infectado após ordenha (repetir após 24h)	Intramamária	72h após a última aplicação
SUPRONAL L	Trimetoprima + Sulfadiazina	Vacas em lactação no tratamento das mastites agudas, subagudas e clínicas	1 seringa no quarto infectado. Repetir o tratamento durante 3 ordenhas consecutivas	Intramamária	36h após a última aplicação
VETIMAST PLUS VL	Cefalexina + Neomicina + Miconazol + Prednisolona	Controle de mastites agudas e crônicas dos bovinos	1 única aplicação é o suficiente, nos casos severos ou crônicos repetir a aplicação após 12 e 24h	Intramamária	4 dias da última aplicação do produto

Antibióticos Intramamários para vacas secas

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVIGAM VS	Ampicilina + Cloxacilina	Mastites causadas por <i>Staphylococcus</i> spp, <i>Streptococcus</i> spp, <i>Corynebacterium</i> spp, <i>Pasteurella</i> spp, <i>Clostridium</i> spp, <i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp, <i>Salmonella</i> spp, <i>Proteus</i> spp	Aplicar 1 seringa de Bovigam VS em cada quarto imediatamente após secar a vaca	Intramamária	45 dias entre a aplicação do produto e a data prevista do parto. O leite das vacas tratadas somente deverá ser utilizado para consumo humano depois de 96h do parto
CEPRAVIN	Cefalônio anidro	Tratamento de mastite em vacas secas	Usar 1 seringa para cada quarto após a última ordenha da lactação	Intramamária	96h após o parto, se o intervalo entre a administração e o parto for de pelo menos, 51 dias
EMEMAST VS	Espiramicina + Neomicina	Tratar e proteger contra as mastites no momento da secagem das vacas	Empregado após a última ordenha do animal, ou seja, no momento da secagem da vaca, aplicar todo o conteúdo de 1 seringa em cada quarto do úbere, em dose única	Intramamária	Em caso de parto prematuro, menos de 7 semanas após o tratamento, o leite do animal tratado não deverá ser utilizado para consumo ou comercializado para a indústria de laticínios por até 15 dias após a ocorrência desse parto
MASTIFIN VS	Sulfato de gentamicina	Tratamento das mastites fora do período de lactação (vaca seca)	Após a última ordenha da lactação, aplicar todo o conteúdo de 1 seringa em cada quarto do úbere, em dose única	Intramamária	Não administrar em vacas leiteiras em lactação
ORBENIN	Cloxacilina	Prevenção ou tratamento de rotina da mastite infecciosa de vacas fora do período de lactação	Aplicar 1 seringa por quarto mamário, após a última ordenha	Intramamária	42 dias após a última aplicação do produto
VETIMAST PLUS VS	Cefalexina + Neomicina + Miconazol	Tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação	Após a última ordenha da lactação, aplicar todo o conteúdo de uma seringa, em cada quarto do úbere em dose única	Intramamária	Caso ocorra o parto antes da data prevista, o leite só poderá ser liberado para o consumo humano após terem passados entre 6 a 10 dias da aplicação do produto

Antibióticos Injetáveis

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
AFILOSINA	Tilosina	Infecções bacterianas	5 ml/100 kg de peso por dia, por um período mínimo de 48h após o desaparecimento dos sintomas	Intramuscular	48h (4 ordenhas)
AGROVET PLUS	Benzilpenicilina procaína + Diidroestreptomicina + Piroxican + Procaína	Infecções bacterianas	1 ml para cada 20 kg de peso corporal, diariamente, durante 3 a 5 dias	Intramuscular profunda	O leite proveniente de vacas tratadas só poderá ser consumido após decorridas 72h da última aplicação do produto
BORGAL	Sulfadoxina + Trimetopima	Infecções bacterianas	<u>Adultos:</u> 20 a 30 ml <u>Jovens:</u> 5 a 15 ml Dose única	Intramuscular, endovenosa ou subcutânea	Leite para consumo humano: 24h ou uma ordenha
CEFTIOMAX	Cloridrato de ceftiofur	Infecções bacterianas	1 a 2 ml de suspensão para cada 50 kg de peso corporal, repetidas em intervalos de 24h, por um período mínimo de 3 dias	Intramuscular profunda e/ou via subcutânea	Não há
COBACTAN	Sulfato de ceftquinoma	Infecções bacterianas	1 ml de Cobactan para 25 kg de peso, diariamente, durante 3 a 5 dias	Intramuscular	12h pós-tratamento
CORTA CURSO	Hicliato de doxiciclina + Benzetimide cloridrato	Infecções bacterianas	1 ml para cada 10 kg de peso corporal. Se necessário, repetir o tratamento 24h após a primeira injeção	Intramuscular	5 dias da última aplicação do produto
ESTREPTOMAX	Estreptomicina	Infecções bacterianas	1,5 ml para cada 50 kg de peso corporal, com intervalos entre 8 e 12h, não devendo ultrapassar 7 dias de tratamento	Intramuscular	24h após a última aplicação
GANASEG PLUS	Diacetato de diminazene + Vitamina B12 + Antipirina	Bovinos infectados com babesia causada por <i>Babesia spp</i>	1 ml para 10 kg de peso corporal. Uma injeção é normalmente suficiente	Intramuscular	Não administrar em vacas leiteiras lactantes
GENTAMOX	Gentamicina + Amoxicilina	Infecções bacterianas	1 ml/dia para cada 10 kg de peso vivo, durante 3 dias	Intramuscular profunda	3 dias (6 ordenhas) para o leite

Antibióticos Injetáveis

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
IMICARB	Imidocarb (dipropionato)	Tratamento profilático e curativo da babesiose causada por <i>Babesia spp</i> e da anaplasmosose causada por <i>Anaplasma marginale</i>	No tratamento da anaplasmosose e das infecções mistas (por <i>Anaplasma</i> + <i>Babesia</i>), administrar 1 ml para cada 40 kg de peso corporal	Subcutânea	Não usar em animais em lactação
IMIZOL	Dipropionato de imidocarb	Tratamento profilático e curativo da babesiose (piroplasmose) e anaplasmosose	2,5 ml para cada 100 kg de peso corporal	Subcutânea	Não usar em animais em lactação
KINETOMAX	Enrofloxacino	Infecções bacterianas	Aplicar 3 ml para cada 40 kg de peso corporal, em dose única. Se necessário repetir após 72h	Intramuscular, endovenosa ou subcutânea	3 dias
MINOXEL PLUS	Ceftiofur cloridrato	Infecções bacterianas	1 a 2 ml de suspensão para cada 50 kg de peso corporal, repetidas em intervalos de 24h, por um período mínimo de 3 dias	Intramuscular ou subcutânea	Não há
OUROTETRA PLUS LA	Oxitetraciclina + Diclofenaco	Infecções bacterianas	1 ml para cada 10 kg de peso corporal	Intramuscular profunda ou subcutânea	Não destinar ao consumo humano o leite de animais tratados antes de decorridos 7 dias após a última aplicação do produto
PARTOCILINA	Benzilpenicilina sódica + Penicilina G clemizolo + Sulfato de dihidroestreptomicina + Maleato de ergometrina + Vitamina K3 + Difilina	Infecções bacterianas ligadas ao parto	20 ml de solução reconstituída/ animal. Uma segunda dose pode ser administrada após 24h	Intramuscular profunda	8 dias após a última aplicação do produto

Antibióticos Injetáveis

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
PENFORT PPU	Benzil penicilina G Procaína + Benzil penicilina G Benzatina + Diidroestreptomicina	Infecções bacterianas	Dosagem média de 1 ml para cada 10 kg de peso corporal. O tratamento é em dose única, mas poderá ser repetido após 72h, caso os sintomas não desapareçam	Intramuscular profunda	Não destinar ao consumo humano o leite antes de decorridas 72h, após a última aplicação do produto
PIROFORT	Diaceturato de diminazeno	Infecções por babesias (piroplasmose) e tripanossomas	1 ml da solução para cada 20 kg de peso corporal, em dose única	Intramuscular profunda	5 dias após a última aplicação do produto
QUINOTRIL	Enrofloxacino	Infecções bacterianas	0,5 ml para cada 20 kg de peso corporal, durante 3 dias	Intramuscular ou subcutânea	Não utilizar em vacas leiteiras em lactação
QUINOTRIL PLUS	Enrofloxacino + Diclofenaco	Infecções bacterianas	1 ml para 40 kg, uma vez por dia, durante 3 dias	Intramuscular ou subcutânea	Não utilizar em vacas leiteiras em lactação
SUPERTRIN	Sulfadiazina + Trimetoprim	Infecções bacterianas	1 ml para 30 kg de peso vivo, por dia, de 3 a 5 dias	Intramuscular profunda	Não utilizar o leite para o consumo humano durante o tratamento ou até 3 dias da última aplicação
TALCIN MAX	Oxitetraciclina + Piroxicam	Infecções bacterianas	1 ml para cada 10 kg de peso corporal	Intramuscular	Não utilizar em vacas leiteiras em lactação
TERRAMICINA/LA	Oxitetraciclina	Infecções bacterianas	1 ml para cada 10 kg de peso corporal	Intramuscular profunda ou subcutânea	O leite de vacas em tratamento e nas 96h seguintes ao tratamento, não deve ser usado para consumo humano
TOPCEF	Ceftiofur sódico	Infecções bacterianas	Aplicar 1 ml da solução reconstituída estéril para cada 50 kg de peso corpóreo. 1 aplicação diária por 3 dias consecutivos	Intramuscular	Não há
TORMICINA LA	Oxitetraciclina	Infecções bacterianas	1 ml para cada 10 kg de peso corporal	Intramuscular profunda	Não administrar em vacas leiteiras lactantes
TRISSULFIN INJETÁVEL	Sulfametoxazol + Trimetoprim	Infecções bacterianas	1 ml para cada 15 kg de peso vivo, por dia, durante 5 (cinco) dias consecutivos	Intramuscular, endovenosa ou subcutânea	Suspender o tratamento 5 dias antes do aproveitamento do leite para consumo humano

Analgésicos e Anti-inflamatórios

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
D - 500	Dipirona sódica	Analgésico, com ação anti-pirética e antiflogística, indicado no tratamento das dores do sistema muscular, esquelético e visceral	<u>Adultos:</u> 20 ml por vez <u>Bezerros:</u> 10 ml por vez	Intramuscular ou endovenosa	Não há
DESFLAN	Flunixin (meglumina)	Analgésico, não narcótico, não esteróide, recomendado para todos os casos de dor, febre e/ou inflamação para bovinos	1 a 2 ml para cada 45 kg de peso corporal, uma vez ao dia, por até 5 dias	Intramuscular ou intravenosa	Não usar em vacas leiteiras em lactação ou secas
DICLOFENACO 50	Diclofenaco sódico	Analgésico, não narcótico, não esteróide, para todos os casos de dor, febre e/ou inflamação	1 ml para cada 50 kg de peso corporal. O tratamento pode ser repetido durante 5 dias consecutivos	Intramuscular, intravenosa ou subcutânea	3 dias após a última aplicação do produto
ISACORT	Dexametasona	Inflamações, artrites, bursites, cetose, febre vitular e do transporte	2,50 a 5 ml/animal. A dose de manutenção nos tratamentos prolongados, é a metade da indicada	Endovenosa, intramuscular ou intra-articular	Não há
NAQUASONE INJETÁVEL	Dexametasona + Triclorometiazida	Tratamento do edema fisiológico do parto, das glândulas mamárias e estruturas acessórias em fêmeas bovinas	10 a 20 ml/animal. Repetir após 24h, se necessário	Intramuscular	72h do último tratamento
NIGLUMINE	Flunixin meglumina	No tratamento de inflamação aguda associada com enfermidades do trato respiratório	0,044 ml/kg. Repetir se for necessário, com intervalos de 24h, porém por não mais que 5 dias consecutivos	Intramuscular ou intravenosa	2 dias para o aproveitamento do leite para consumo humano
VETFLOGIN	Diclofenaco sódico	Atividade anti-inflamatória, analgésica ou antipirética	1 ml/50 kg de peso corpóreo. Quando necessário, as doses devem ser repetidas a cada 24h	Intramuscular profunda, subcutânea ou intravenosa	4 dias após a última injeção

Antitóxicos

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
HEPATOXAN	DL-Metionina + Cloreto de colina + Nicotinamida + Dextrose + Cloridrato de tiamina + Cloridrato de piridoxina + Cafeína	Estados tóxicos ou tóxico-infecciosos	<u>Animais de grande porte:</u> 80 a 100 ml	Endovenosa ou subcutânea	Não há
MERCEPTOM	Acetil DL-Metionina Cloreto de Colina Cloridrato de Tiamina Cloridrato de Piridoxina + Cloridrato de L-Arginina + Riboflavina + Nicotinamida+ Pantotenato de Cálcio+ Glicose	Hepatoprotetor + Imunoestimulante + Lipotrópico	<u>Animais de grande porte:</u> 20 a 100 m/dia	Intramusculares ou endovenosas	Não há

Antiparasitários

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
ACATAK POUR-ON	Fluazuron	Controle estratégico do carrapato dos bovinos	5 ml/50 kg de peso corporal	A dose recomendada deve ser administrada em duas faixas, em ambos os lados da linha mediana dorsal, da nuca até a garupa com o aplicador ACATAK Pour-On	Não administrar em vacas leiteiras em idade de reprodução
ASPERSIN	Cipermetrina R-S + Clorpirifós	Controle e tratamento das infestações provocadas por: bernes, insetos hematófagos, especialmente a mosca-dos-chifres, carrapatos, ácaros da sarna, piolhos sugadores e piolhos mastigadores	17 ml de Aspersin preparam-se 20 litros de calda. Deve-se utilizar de 1 a 3 litros da solução por animal	Banhos de aspersão, através de bombas manuais ou mecânicas	48h após a última aplicação
CICLORFÓS	Cipermetrina + Clorpirifós	Controle de sarnas, piolhos, carrapatos e moscas de bovinos	Como carrapaticida: 1 litro do produto para cada 1.000 litros de água. Repetir 24 a 28 dias após o 1º tratamento	O produto é indicado em banhos de aspersão ou pulverização com pulverizadores, bombas mecânicas ou manuais	O leite proveniente de animais tratados não deverá ser aproveitado para consumo humano antes de decorridas 6h da última aplicação
COLOSSO PULVERIZAÇÃO	Cipermetrin + Clorpirifós + Citronelal	Combate dos carrapatos, bernes, moscas e piolhos	25 ml de colosso / 20 litros de água. Usar aproximadamente 5 litros por bovino adulto em pulverização	Banho de Imersão ou Pulverização	3 dias após a última aplicação
GENESIS IVER POUR-ON	Ivermectina	Controle e tratamento de vermes redondos gastrintestinais e pulmonares, bernes, piolhos, ácaros agentes da sarna, como auxiliar nos controles de carrapatos (<i>Boophilus microplus</i>) e moscas	1 ml para cada 20 kg de peso corporal	No fio do lombo	Não há

Antiparasitários

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
IVOMEC GOLD	Ivermectina a 3,15%	Tratamento, controle e prevenção eficaz das infecções causadas por vermes redondos (gastrointestinais e pulmonar), infestações por berne, carrapato, piolhos sugadores, ácaros causadores das sarnas Sarcóptica e Psoróptica dos bovinos	1 ml para cada 50 kg de peso	Subcutânea na frente ou atrás da paleta	Não deve ser aplicado em vacas em lactação, cujo leite destine-se ao consumo humano, ou num período inferior a 122 dias antes do parto
VINGADOR MATA BICHEIRA	Clorpirifós + Diclorvós + Violeta genciana	Larvicida, repelente, cicatrizante e antisséptico, indicado para a eliminação e prevenção de míases cutâneas (bicheiras)	Aplicar em toda a área afetada, bem como ao seu redor, uma vez ao dia, mantendo o tubo a uma distância entre 10 a 20 cm da pele do animal até a completa cicatrização da ferida	Uso tópico	Não há
RIPERCOL L - 150 F	Fosfato de levamisol	Controla todos os helmintos de importância econômica	1 ml para cada 40 kg de peso vivo	Injeções subcutâneas	48h
TACPLUS	Amitraz	Combate de ectoparasitos	Diluir 1 litro do produto para 500 litros de água. O consumo para molhar um bovino adulto não deve ser inferior a 5 litros	Uso externo em banhos de pulverização, utilizando-se qualquer tipo de pulverizador manual ou motorizado	24h da última aplicação
TOPLINE POUR-ON	Fipronil	Controle do <i>Boophilus microplus</i> , <i>Dermatobia hominis</i> , Mosca-dos-chifres e <i>Cochliomyia hominivorax</i> (bicheira)	1 ml do produto para cada 10kg de peso (10 ml/100kg)	Aplicado sobre a linha média superior (dorso-lombo) dos animais, no espaço compreendido entre a cernelha (cruzes) até a articulação lombo-sacral	É somente indicado para uso em gado de corte
VALBAZEN	Albendazole + Sulfato de cobalto	Controle e tratamento de endoparasitoses	1 a 2 ml/20 kg de peso	Via oral	Não administrar o produto em fêmeas prenhes durante os primeiros 45 dias de gestação

Soros e Vitaminas

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
CALCIFÓS	Gluconato de cálcio + Hipofosfito de sódio + Cloreto de magnésio + Dextrose + Ácido bórico	Na terapêutica da hipocalcemia e hipomagnesemia, tais como: eclâmpsia gravídica, tetanias em geral, convulsões, febre vitular ou febre do leite, paraplegia pré e pós-parto e também em casos de acetoneurias e hipofosforoses	Animais de grande porte 50 a 500 ml	Endovenosa ou pelas vias intramuscular e subcutânea em diversos pontos, quando necessário	Não há
CÁLCIO REFORÇADO	Gluconato de cálcio + Cloreto de magnésio hidratado + Fosfato de sódio monobásico + Dextrose	Colapso puerperal hipocalcêmico, tetania hipocalcêmica, durante e após o parto e durante a lactação (febre vitular, eclâmpsia). Tetania das pastagens, tetania de viagens (cãibras), intoxicações, osteodistrofias (osteoporose, osteofibrose), raquitismo, osteomalácia (cara inchada) e nos casos de carência de cálcio, fósforo e magnésio	100 a 250 ml	Intravenosa lenta	Não há
FERRODEX	Ferro elementar	Prevenção e tratamento da anemia	Bezerros: 4 ml (em dieta láctea exclusiva)	Intramuscular	Não há
FORTEMIL	B ₂ + B ₆ + Nicotinamida + A. metionina + Cloreto de sódio + Cloreto de potássio + Cloreto de cálcio + Cloreto de magnésio + Dextrose	Esgotamento físico por excesso de trabalho ou de produção	1 a 2 litros (adultos)	Intravenosa ou subcutânea	Não há
FOS BIO + D₂	Fosfato tricálcico + Glicerofostato de sódio + Cloreto de cálcio + Vitamina D ₂	Carências primárias nutricionais, promovidas por deficiências minerais no solo, pasto e água	15 a 20 ml (vacas)	Subcutânea	Não há

Soros e Vitaminas

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÃO	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
GLUCAFÓS	Gluconato de cálcio + Ácido bórico + H.de magnésio + Dextrose anidra + Clorocresol	Hipocalcemia e hipomagnesemia, por exemplo: febre vitular, eclâmpsia, tetania das pastagens etc. Nos estados alérgicos, intoxicações (BHC, DDT, etc.) e urticária	<u>Bovinos (adultos):</u> 200 a 500 ml	Subcutânea e intravenosa (aplicar lentamente)	Não há
KERA DRENCH	Propionato de cálcio (600 g/kg) + Cloreto de potássio + Cloreto de cálcio + Óxido de magnésio + Levedura Probiótica Viva (1 trilhão de UFC/kg) + Paredes de Levedura	Para vacas logo após o parto	Após o parto dissolver 1 kg em 30 litros de água morna em um balde e oferecer ao animal. Repetir a dose após 24h se for necessário, ou conforme indicação do veterinário responsável	Oral	Não há
VALLÉ VITA ADE	Vitamina A + Vitamina D3 + Vitamina E	Prevenção e tratamento do raquitismo	5 ml cada 60 dias (vacas)	Intramuscular	Não há

Vacina contra Mastite

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÕES	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
TOPVAC	<i>Escherichia coli</i> (J5) inativada e <i>Staphylococcus aureus</i> (CP8) cepa SP140 inativado, expressando Complexo Antigênico Associado de Cápsula (SAAC)	Reduzir a incidência e a severidade dos sintomas da mastite clínica e subclínica causada por <i>S. aureus</i> , coliformes ou estafilococos coagulase negativa	2 ml/bovino (vacas e novilhas). Primeira vacinação aos 45 dias antes da data esperada de parto. Segunda vacinação 35 dias depois (correspondendo a 10 dias antes da data esperada de parto). Terceira vacinação 62 dias depois da segunda vacinação (vacinação de impulso). O programa total de vacinação deve ser repetido a cada gestação	Intramuscular profunda no músculo do pescoço (preferencialmente em locais alternados)	Não há Obs: estocar e transportar sob refrigeração (2 a 8°C)

Hormônios e Análogos

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÕES	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
BOOSTIN	Somatotropina bovina recombinante + Vitamina E (Acetato) + Lecitina	Indicado para aumentar a produção de leite em vacas em lactação	1 seringa de 2 ml (500 mg de BST-r) a cada 14 dias	Subcutânea, na fossa isquio-retal	Não há
OCITOVET	Ocitocina sintética	Promoção da descida do leite	1 a 2 ml	Subcutânea, intramuscular ou endovenosa lenta	Não há
POSTIPOFISIN	Ocitocina + Metilparabeno	Inércia uterina, hemorragia resultante da expulsão placentária, retenção da placenta, constipação e atonia da bexiga	6 a 10 ml	Intramuscular ou intravenosa (aplicação lenta)	72h da última aplicação
PROFERTIL	Gonadorelina (GnRH) - sob a forma de deacetato tetrahidrato liofilizada	Incremento da fertilidade no período pós-parto. Melhora da fertilidade na inseminação artificial. Anestros, cistos ováricos foliculares e foliculares luteinizados	1 a 5 ml, de acordo com a indicação	Intramuscular, subcutânea ou intravenosa	Não há
SINCROCIO	Cloprostenol sódico	Agente luteolítico e sincronizador de cio	2 ml	Intramuscular	Não há
SINCROFORTE	Acetato de busereлина	Protocolos reprodutivos na indução da ovulação e luteinização de foliculos. Incremento da fertilidade (aumento dos índices de concepção) na inseminação artificial. Tratamento de transtornos de fertilidade de origem ovariana: cistos foliculares, atraso na ovulação e anestros	2,5 a 5 ml	Intramuscular, subcutânea ou intravenosa	Não há

Homeopantias

NOME	PRINCÍPIO ATIVO	INDICAÇÕES	DOSAGEM	VIA DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE CARÊNCIA
FATOR M&P PÓ	-	Controle da mastite	3,2 g/animal/dia	Oral, misturar ao sal mineral ou rações	Não há
CONVERT H LEITE	-	Ativa o sistema imunológico inespecífico, promovendo o equilíbrio orgânico	<u>Alta produção</u> : fornecer até 200 g/cab/dia	Misturar na ração/concentrados, colocando sobre os alimentos no cocho	Não há
MASTITE	-	Previne as mastites clínicas e subclínicas, reduzindo a Contagem de Células Somáticas (CCS)	<u>Alta produção</u> : 30 g/cab/dia do produto	Via suplementos mineral/proteico à vontade no cocho e ainda adicionar nas rações ou farelos	Não há
PAPILOMATOSE	-	Estimula as defesas naturais do organismo animal promovendo a queda das verrugas e a regeneração da pele	<u>Preventivo</u> : fornecer de 2 a 4 g/cab/dia via suplemento mineral/ <u>Curativo</u> : garantir a ingestão mínima de 40 g/cab/dia via rações/farelos até o desaparecimento total das verrugas	Via rações/farelos	Não há
PARASITÁRIO	-	Atua estimulando as defesas do organismo a nível de pele e mucosa digestiva, reduzindo as infestações por carrapatos, bernes, moscas e vermes gastrointestinais	Fornecer de 10 a 15 g/cab/dia. Nos casos de parasitismo intenso duplicar as doses acima indicadas	Via rações/farelos	Não há
PASTA ENTÉRICA	-	Estimula e fortalece o sistema imunológico curando as diarreias	<u>Bovinos de Leite até a desmama</u> : fornecer 10 g/dia, 2x ao dia <u>Recria e adultos</u> : fornecer 45 g/dia, 2 dias seguidos	Oral	Não há

Fonte: Compêndio de Produtos Veterinários SINDAN - Mapa - www.cpv.com.br

Contato das unidades do Clube do Produtor

Rio Grande do Sul

Porto Alegre
Administração BRF
(51) 3204-7210

Alegrete
(55) 3422-2508

Bagé
(53) 3241-0428

Cerro Largo
(55) 3359-1159

Chapada
(54) 3333-1070

Frederico Westphalen
(55) 3744-4311

Ijuí
(55) 3332-9966

Jacutinga
(54) 3368-1373

São Lourenço
(53) 3251-3044

Tapera
(54) 3385-2255

Teutônia
(51) 3762-5686

Três de Maio - Delta
(55) 3535-9811

Santa Catarina

Campo Erê
(49) 3655-2191

Concórdia
(49) 3301-7112

Mafra
(42) 3231-8712

Planalto Alegre
(49) 3335-0124

São Miguel do Oeste
(49) 3622-6050

Paraná

Carambeí
(42) 3231-8629

Mato Grosso do Sul

Terenos
(67) 3246-0047

Goiás

Itumbiara
(64) 3432-2328

Mineiros
(64) 3672-7555

Rio de Janeiro

Barra Mansa
(24) 3326-8836

São Paulo

Parisi
(17) 3839-7276

Minas Gerais

Bicas
(32) 3271-1143

Cristina
(35) 3281-1502

Frutal
(34) 3423-6095

Sabará
(31) 3079-3504

Pernambuco

Bom Conselho
(87) 3771-4006

Clube do
Produtor
de Leite



clubedoprodutor@brasilfoods.com